

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E_3.Χλ3Θ(ε)

ΤΑΞΗ: Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Για τις ερωτήσεις A1 έως και A4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

A1. Η ηλεκτρονική δομή του ^{24}Cr , στην θεμελιώδη κατάσταση, είναι:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
- β) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2$
- γ) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$
- δ) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$

μονάδες 5

A2. Αν διάλυμα NH_4A έχει $pH = 8$ σε θερμοκρασία $25^\circ C$, τότε:

- α) το HA είναι μαλακό οξύ
- β) το HA είναι ασθενές οξύ με $Ka(HA) > Kb(NH_3)$
- γ) το HA είναι ασθενές οξύ με $Ka(HA) = Kb(NH_3)$
- δ) το HA είναι ασθενές οξύ με $Ka(HA) < Kb(NH_3)$

μονάδες 5

A3. Στο φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου που προκύπτει από την μετάπτωση του ηλεκτρονίου από την στιβάδα Μ στην στιβάδα Κ, το μέγιστο πλήθος φασματικών γραμμών που μπορούν να καταγραφούν είναι:

- α) μία
- β) δύο
- γ) τρεις
- δ) έξι

μονάδες 5

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E_3.Χλ3Θ(ε)

- A4.** Στην ένωση $CH_2 = C = CH_2$, μεταξύ δύο διαδοχικών ατόμων των άνθρακα υπάρχουν:
- δύο πι (π) δεσμοί με επικάλυψη p τροχιακών
 - ένας πι (π) δεσμός με επικάλυψη p τροχιακών και ένας σίγμα (σ) του τύπου $sp^3 - sp^2$
 - ένας πι (π) δεσμός με επικάλυψη p τροχιακών και ένας σίγμα (σ) του τύπου $sp^2 - sp^2$
 - ένας πι (π) δεσμός με επικάλυψη p τροχιακών και ένας σίγμα (σ) του τύπου $sp - sp^2$.

μονάδες 5

- A5.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- H ενεργειακή ταξινόμηση των υποστιβάδων στο κατιόν $_2He^+$ είναι $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d$.
 - Το οξικό οξύ συμπεριφέρεται σε κάθε διάλυμα ως ασθενές οξύ.
 - Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος HCl σε υδατικό διάλυμα είναι 0,4, ενώ του οξέος HB σε υδατικό διάλυμα ίδιας θερμοκρασίας, είναι 0,6. Επομένως, το HB είναι ισχυρότερο οξύ.
 - Οι M και N είναι ασθενείς βάσεις. Αν $K_b(M) < K_b(N)$ τότε η αντίδραση $M + NH^+ \rightleftharpoons MH^+ + N$ είναι μετατοπισμένη δεξιά.
 - Υδατικό διάλυμα CH_3OH στους $30^\circ C$ έχει $pH > 7$.

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Δίνονται τα επόμενα στοιχεία: $_6C$, ^{12}Mg , ^{15}P και $_Z X$.

- Να βρεθεί ο ελάχιστος ατομικός αριθμός (Z) του στοιχείου X αν γνωρίζουμε ότι αυτό διαθέτει ίσο αριθμό πλήρως συμπληρωμένων s και p ατόμικών τροχιακών και συνολικό άθροισμα spin των ηλεκτρονίων του ίσο με $+\frac{1}{2}$. (μονάδες 2)
- Ένα από τα παραπάνω στοιχεία διαθέτει τις παρακάτω ενέργειες ιοντισμού: $E_{i1} = 286 \text{ kJ/mol}$, $E_{i2} = 491 \text{ kJ/mol}$, $E_{i3} = 3208 \text{ kJ/mol}$, $E_{i4} = 3604 \text{ kJ/mol}$. Να δικαιολογήσετε σε ποιο από τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να ανήκουν οι τιμές αυτές. (μονάδες 2)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E_3.Χλ3Θ(ε)

- γ) Να γραφούν οι δομές κατά Lewis των ενώσεων CO_2 , PCl_5 , CH_3MgBr . (μονάδες 4,5)
- δ) Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ που ανήκει στην ίδια περίοδο με το X και σχηματίζει βασικό οξείδιο του τόπου Ψ_2O . (μονάδες 1,5)

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: $_8O$, $_{17}Cl$, $_{35}Br$, $_{1}H$.

μονάδες 10

B2. Διαθέτουμε τρία διαλύματα Δ_1 , Δ_2 και Δ_3 των μονοξίνων βάσεων Α, Β και Γ αντίστοιχα. Σε κάθε ένα από τα διαλύματα πραγματοποιήθηκαν:

- i) μέτρηση pH του αρχικού διαλύματος.
ii) ογκομέτρηση δείγματος 10 mL με πρότυπο διάλυμα HCl .

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μετρήσεις		A	B	Γ
i	pH αρχικού διαλύματος	11	10	11
ii	όγκος πρότυπου δ/τος HCl (mL)	5	5	50

- α) Να εξηγήσετε ποια από τις βάσεις είναι ισχυρότερη.

μονάδες 3

- β) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μέτρηση pH του διαλύματος που προκύπτει μετά από αραίωση δείγματος όγκου 10 mL με νερό στον εκατονταπλάσιο όγκο.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μετρήσεις	A	B	Γ
i pH αρχικού διαλύματος	11	10	11
iii pH αραιωμένου διαλύματος	9	9	10

Να εξηγήσετε γιατί μια από τις βάσεις είναι ισχυρή.

μονάδες 2

γ) Ποιος από τους δείκτες που ακολουθούν είναι καταλληλότερος για την ογκομέτρηση κάθε διαλύματος βάσης;

- γ1) 2,4 – δινιτροφαινόλη ($k_a = 10^{-3}$).
γ2) Κυανό της βρωμοθυμόλης ($k_a = 10^{-7}$).
γ3) Φαινολοφθαλεΐνη ($k_a = 10^{-9}$).

μονάδες 2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012


E_3.Χλ3Θ(ε)

- B3.** Υδρογονάνθρακας Α έχει εννέα σ (σίγμα) και δύο π (πι) δεσμούς.
- Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα; (μονάδες 2)
 - Αν η ένωση Α μπορεί να δώσει αντίδραση πολυμερισμού τύπου 1,4 να βρεθεί ο συντακτικός της τύπος. (μονάδες 2)
Πως μπορεί να παρασκευαστεί με πρώτη ύλη την ένωση Α το τεχνητό καουτσούκ; (μονάδες 1)
 - Ένωση Β που αποτελεί ισομερές ομόλογης σειράς της Α δεν αντιδρά με μεταλλικό νάτριο. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της ένωσης Β (μονάδες 1) και να εξηγήσετε αν όλα τα άτομα άνθρακα της ένωσης βρίσκονται στην ίδια ευθεία. (μονάδες 2)

μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

- Γ1.** Αν η σχετική μοριακή μάζα της οργανικής ένωσης (Α) είναι ίση με 88, να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ένωσεων Α, ... Ν, στο παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:



μονάδες 15

	ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E_3.Χλ3Θ(ε)

- Γ2.** Να βρεθεί ο όγκος διαλύματος $K_2Cr_2O_7 / H_2SO_4$ συγκέντρωσης $0,1\text{M}$ που μπορεί να αποχρωματιστεί κατά την πλήρη μετατροπή $52,8\text{ g}$ της ένωσης (A) στην ένωση (Z).

μονάδες 4

- Γ3.** Σε $7,8\text{ g}$ ισομοριακού μίγματος δύο οργανικών ενώσεων του τύπου $C_kH_{2k+2}O$ επιδρούμε με περίσσεια μεταλλικού νατρίου (Na) και εκλύεται αέριο υδρογόνο όγκου $1,12\text{ L}$ μετρημένο σε stp συνθήκες. Σε ίση ποσότητα μίγματος επιδρούμε με περίσσεια διαλύματος $KMnO_4$ οξινισμένου με H_2SO_4 , οπότε εκλύεται αέριο CO_2 όγκου $2,24\text{ L}$ μετρημένο σε stp συνθήκες. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων του μίγματος, και να δικαιολογηθεί η απάντησή σας.

μονάδες 6

Δίνονται: $A_r(H) = 1$, $A_r(C) = 12$, $A_r(O) = 16$.

Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις θεωρούνται πλήρεις και μονόδρομες και σε όλες παράγονται μόνο τα κύρια προϊόντα.

ΘΕΜΑ Δ

Σε διάλυμα Δ1 μονοβασικού θέξεος HA συγκέντρωσης $C_1 = 0,1\text{M}$ βρέθηκε $[H_3O^+] = 10^8 [OH^-]$.

- Δ1.** Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του οξέος HA.

μονάδες 5

- Δ2.** Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμιχθεί το διάλυμα Δ1 με διάλυμα Δ2 άλατος NaA με $pH = 9$, ώστε να προκύψει διάλυμα με $pH = 5$.

μονάδες 6

- Δ3.** Πόσα mol HCl πρέπει να προσθέσουμε σε 200 ml διαλύματος Δ3 άλατος NaA και συγκέντρωσης $C_3 = 0,2\text{M}$ ώστε να προκύψει διάλυμα όγκου 200 ml με $pH = 2$.

μονάδες 8

- Δ4.** Σε 200 ml διαλύματος Δ1 προσθέτουμε ασβέστιο (Ca) οπότε σχηματίζεται διάλυμα Δ4 όγκου 200 ml , ενώ εκλύεται αέριο υδρογόνο όγκου 224 ml μετρημένα σε stp. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Δ4.

μονάδες 6

Δίνονται:

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία $25\text{ }^\circ\text{C}$, $K_w = 10^{-14}$.

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.