




## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

### ΘΕΜΑ 1ο

**Οδηγία:** Στις ερωτήσεις 1–5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερωτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης ενός συστήματος, τότε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας:


- α. παραμένει το ίδιο.
- β. διπλασιάζεται.
- γ. υποδιπλασιάζεται.
- δ. τετραπλασιάζεται.



(Μονάδες 4)

2. Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα προς μία ακίνητη πηγή ήχου, ο ήχος που ακούει έχει συχνότητα:


- α. ίδια με αυτή της πηγής.
- β. μικρότερη από αυτή της πηγής.
- γ. μεγαλύτερη από αυτή της πηγής.
- δ. ίδια με τη συχνότητα του ήχου που ακούει, όταν απομακρύνεται από την πηγή με την ίδια ταχύτητα.



(Μονάδες 4)

3. Μια μονοχρωματική ακτίνοβολία, όταν διαδίδεται σε ένα μέσο με δείκτη διάθλασης 1,5, έχει μήκος κύματος 300 nm. Η ακτίνοβολία αυτή είναι:

- α. ορατή.
- β. ακτίνες X.
- γ. υπεριώδης.
- δ. υπέρυθρη.




(Μονάδες 4)




4. Υλικό σημείο εκτελεί κυκλική κίνηση κέντρου  $K$ , όπως φαίνεται στο σχήμα. Το διάνυσμα  $\vec{x}$  που διέρχεται από το  $K$  και είναι κάθετο στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς **δεν** μπορεί να είναι:

- a.** γωνιακή ταχύτητα.
- b.** γωνιακή επιτάχυνση.
- c.** ορμή.
- d.** στροφορμή.



5. Κατά τη διάρκεια της κρούσης δύο σωμάτων, διατηρείται:


- a.** η ορμή του κάθε σώματος.
- b.** η ορμή του συστήματος.
- c.** η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.
- d.** η κινητική ενέργεια του συστήματος.



6. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα  $\Sigma$ , αν είναι σωστή, και με το γράμμα  $\Lambda$ , αν είναι λανθασμένη.

- a.** Η περίοδος μιας φθίνουσας ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης.
- b.** Μια από τις μονάδες του δείκτη διάθλασης είναι το 1 nm.
- c.** Το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής φώτισης παρατηρείται, όταν μια ακτίνα φωτός μεταβαίνει από ένα οπτικά πυκνότερο σε ένα οπτικά αραιότερο μέσο.
- d.** Ένα στερεό σώμα είναι δυνατό να έχει κινητική ενέργεια, χωρίς να έχει ορμή.
- e.** Στο φαινόμενο Doppler οι ταχύτητες της πηγής και του παρατηρητή αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του μέσου διάδοσης.

(Μονάδες 5)



## ΘΕΜΑ 2ο

1. Υλικό σημείο μάζας  $m$  διαγράφει κυκλική τροχιά ακτίνας  $r$  με ταχύτητα σταθερού μέτρου  $v$ . Η κινητική ενέργεια του υλικού σημείου μπορεί να υπολογιστεί:




**a.** από τη σχέση  $K = \frac{1}{2}mv^2$ .

**β.** από τη σχέση  $K = \frac{1}{2}I\omega^2$ , όπου  $I$  η ροπή αδράνειας του υλικού σημείου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και είναι κάθερος στο επίπεδό της και  $\omega$  το μέτρο της γωνιακής του ταχύτητας.

**γ.** και από τις δύο παραπάνω σχέσεις.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.




(Μονάδες 8)

**2.** Δύο σώματα  $\Sigma_1$  και  $\Sigma_2$  με μάζες  $m_1$  και  $m_2$  κίνούνται με ταχύτητες  $\vec{v}_1$  και  $\vec{v}_2$  και συγκρούονται κεντρικά. Αν κατά την κρούση τα δύο σώματα ανταλλάσσουν ταχύτητες, να αποδείξετε ότι:

**a.** έχουν ίσες μάζες.

**β.** η κρούση είναι ελαστική.




(Μονάδες 10)

**3.** Μονοχρωματική ακτίνα φωτός, η οποία διαδίδεται αρχικά στον αέρα, προσπίπτει στην επίπεδη επιφάνεια γυαλινής πλάκας πάχους  $d$ , της οποίας ο δείκτης διάθλασης είναι  $n$ . Η γωνία πρόσπτωσης είναι  $45^\circ$ . Να αποδείξετε ότι:

**a.** η ακτίνα εξέρχεται από τη γυαλινή πλάκα.

**β.** η εξερχόμενη ακτίνα είναι παράλληλη προς την αρχική.




(Μονάδες 7)

## ΘΕΜΑ 3ο

Ένα περιπολικό με τη σειρήνα του σε λειτουργία κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα  $v_s = 20 \text{ m/s}$ , ανάμεσα σε δύο ακινητους παρατηρητές  $A$  και  $B$ . Ο παρατηρητής  $A$  ακούει ήχο συχνότητας  $f_A = 425 \text{ Hz}$ , ενώ ο παρατηρητής  $B$  ακούει ήχο βαρύτερο από αυτόν που ακούει ο παρατηρητής  $A$ .

**a.** Το περιπολικό κινείται προς τον παρατηρητή  $A$  ή προς τον παρατηρητή  $B$ ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



(Μονάδες 8)




β. Ποια είναι η συχνότητα του ήχου της σειρήνας που θα άκουγε καθένας από τους δύο παρατηρητές, αν το περιπολικό σταματούσε να κινείται;

(Μονάδες 10)

γ. Ποια είναι η συχνότητα του ήχου που ακούει ο παρατηρητής  $B$ , όταν ο παρατηρητής  $A$  ακούει ήχο συχνότητας  $f_A = 425 \text{ Hz}$ ;

Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι  $v = 340 \text{ m/s}$ .



## ΘΕΜΑ 4ο

Η τροχαλία του σχήματος είναι ομογενής με μάζα  $m = 4 \text{ kg}$  και ακτίνα  $R = 20 \text{ cm}$ . Τα σώματα  $\Sigma_1$  και  $\Sigma_2$  έχουν μάζες  $m_1 = 4 \text{ kg}$  και  $m_2 = 2 \text{ kg}$  και το σχοινί που τα συγκρατεί έχει αμελητέα μάζα. Το σώμα  $\Sigma_3$  είναι κολλημένο με άλλο σώμα  $\Sigma_3$  μάζας  $m_3 = 1 \text{ kg}$ . Το σώμα  $\Sigma_3$  είναι στερεωμένο στο άκρο κατακόρυφου ελαστηρίου, σταθεράς  $K = 100 \text{ N/m}$ , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Το σύστημα αρχικά βρίσκεται σε ισορροπία. Τη χρονική στιγμή  $t = 0$  τα σώματα  $\Sigma_2$  και  $\Sigma_3$  αποκολλούνται.

α. Να γράψετε την εξίσωση της απόμακρυνσης της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα  $\Sigma_3$ .

(Μονάδες 5)

β. Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγμή που το σώμα  $\Sigma_3$  διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του για πρώτη φορά.

(Μονάδες 5)

γ. Να υπολογίσετε τη στροφορμή του συστήματος της τροχαλίας και των σωμάτων  $\Sigma_1$  και  $\Sigma_2$  τη χρονική στιγμή  $t = 2 \text{ s}$ .

(Μονάδες 5)

Δίνονται: η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά της  $I = \frac{1}{2} mR^2$  και η επιτάχυνση της βαρύτητας  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

Η τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και το σχοινί είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση. Τα σώματα  $\Sigma_1$ ,  $\Sigma_2$ ,  $\Sigma_3$  είναι μικρών διαστάσεων.

