



ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

**ΖΗΤΗΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Α.**

αριθμός παιδιών $X_i$	οικογένειες $V_i$	σχετικές συχνότητες $f_i$ %	αθροιστικές συχνότητες $N_i$	σχετικές αθροιστικές συχνότητες $F_i$ %
0	3	12	3	12
1	6	24	9	36
2	6	24	15	60
3	8	32	23	92
4	2	8	25	100
Σύνολα	$v = 25$	100	-	-

**Β.** Η μέση τιμή είναι :  $\bar{X} = \frac{v_1 \cdot X_1 + v_2 \cdot X_2 + v_3 \cdot X_3 + v_4 \cdot X_4 + v_5 \cdot X_5}{v}$

$$= \frac{3 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 2 \cdot 4}{25} = \frac{50}{25} = 2$$

Επειδή  $v = 25$  η διάμεσος είναι η 13<sup>η</sup> παρατήρηση, οπότε είναι ίση με 2.

Η επικρατούσα τιμή είναι η τιμή  $X_4 = 3$  γιατί έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα ( $v_4 = 8$ ).

**Γ.** Η διακύμανση είναι

$$S^2 = \frac{v_1 \cdot (\bar{X} - x_1)^2 + v_2 \cdot (\bar{X} - x_2)^2 + v_3 \cdot (\bar{X} - x_3)^2 + v_4 \cdot (\bar{X} - x_4)^2 + v_5 \cdot (\bar{X} - x_5)^2}{v}$$

$$= \frac{3 \cdot (2 - 0)^2 + 6 \cdot (2 - 1)^2 + 6 \cdot (2 - 2)^2 + 8 \cdot (2 - 3)^2 + 2 \cdot (2 - 4)^2}{25}$$

$$= \frac{3 \cdot 4 + 6 \cdot 1 + 6 \cdot 0 + 8 \cdot 1 + 2 \cdot 4}{25}$$

$$= \frac{12 + 6 + 0 + 8 + 8}{25}$$

$$= \frac{34}{25} = 1,36$$

Η τυπική απόκλιση είναι  $S = \sqrt{1,36}$  και ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι  $CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{1,36}}{2} > 0,1$  και επομένως το δείγμα δεν είναι ομοιογενές.

(ή αλλιώς είναι  $\sqrt{1,36} > 1$  οπότε  $\frac{\sqrt{1,36}}{2} > \frac{1}{2}$  ή  $CV > 50\%$  )

(ακριβέστερα είναι  $CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{1,36}}{2} \approx \frac{1,16}{2} = 0,58$  ή 58%.)

- Δ. i) Το πλήθος των οικογενειών που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά είναι  $v_4 + v_5 = 8 + 2 = 10$  και το ποσοστό τους είναι  $\frac{10}{25} \cdot 100\% = 40\%$  .
- ii) Το πλήθος των οικογενειών που έχουν το πολύ 2 παιδιά είναι  $v_1 + v_2 + v_3 = 3 + 6 + 6 = 15$  και το ποσοστό τους είναι  $\frac{15}{25} \cdot 100\% = 60\%$  .
- iii) Το πλήθος των οικογενειών που έχουν ένα μόνο παιδί είναι  $v_2 = 6$  και το ποσοστό τους είναι  $\frac{6}{25} \cdot 100\% = 24\%$  .

### ΖΗΤΗΜΑ 2<sup>ο</sup>

i)  $f(0) = \alpha \cdot 0^2 - 1 = -1$ ,  $f(2) = 4 \cdot 2 - 5 = 3$  και  $f(3) = 4 \cdot 3 - 5 = 7$

ii)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (\alpha \cdot x^2 - 1) = \alpha \cdot 2^2 - 1 = 4\alpha - 1$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (4x - 5) = 4 \cdot 2 - 5 = 3$

iii) Για να είναι συνεχής στο σημείο  $x = 2$ , πρέπει

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

δηλαδή  $4\alpha - 1 = 3$ , άρα  $4\alpha = 4$ , άρα  $\alpha = 1$ .

iv) Για  $\alpha = 1$ , είναι  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & , x < 2 \\ 4x - 5 & , x \geq 2 \end{cases}$

Η  $f(x)$  είναι παραγωγίσιμη για  $x = 2$ , μόνο αν ισχύει:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

- για  $h < 0$ , είναι  $2 + h < 2$  οπότε:

$$f(2+h) = (2+h)^2 - 1 = 4 + 4h + h^2 - 1 = 3 + 4h + h^2, \text{ και}$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{3 + 4h + h^2 - 3}{h} = \frac{h(4+h)}{h} = 4 + h,$$

$$\text{οπότε } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (4 + h) = 4$$

- για  $h > 0$ , είναι  $2 + h > 2$  οπότε:

$$f(2+h) = 4(2+h) - 5 = 8 + 4h - 5 = 3 + 4h, \text{ και}$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{3 + 4h - 3}{h} = \frac{4h}{h} = 4,$$

$$\text{οπότε } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 4 = 4$$

Επομένως  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4$ , οπότε

η  $f$  είναι παραγωγίσιμη για  $x = 2$ , με  $f'(2) = 4$ .

### ΖΗΤΗΜΑ 3<sup>ο</sup>

- α) Είναι  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ , οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 12x + 9}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x^2 - 4x + 3)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x-3)(x-1)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} 3(x-1)$$

$$= 3(3-1) = 6$$

- β)  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + \alpha$ ,  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$  και  
 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$  ή  $x = 3$ .

Κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμων της  $f'(x)$ :

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	T.M.	$\searrow$	T.E.	$\nearrow$

Άρα η  $f$  παρουσιάζει:

- τοπικό μέγιστο στο  $x = 1$  με τιμή  $f(1) = 1 - 6 + 9 + \alpha = 4 + \alpha$  και
- τοπικό ελάχιστο στο  $x = 3$  με τιμή  $f(3) = 27 - 54 + 27 + \alpha = \alpha$ .

- γ) Πρέπει  $f(1) = 2 \cdot f(3) \Leftrightarrow 4 + \alpha = 2 \cdot \alpha \Leftrightarrow \alpha = 4$

- δ) Για  $\alpha = 4$  ο τύπος της  $f(x)$  γίνεται  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$ ,  $x \in \mathbb{R}$

οπότε  $F(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{9x^2}{2} + 4x + c$  με  $F(0) = 0 \Leftrightarrow c = 0$ .

Επομένως η ζητούμενη παράγουσα της  $f(x)$  είναι η συνάρτηση

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{9x^2}{2} + 4x, \quad x \in \mathbb{R}$$

#### ΖΗΤΗΜΑ 4<sup>ο</sup>

- i) Ο ρυθμός μεταβολής της συνάρτησης  $S(t)$  είναι

$$S'(t) = (t^2 + 18 \ln(t+1) + 4)' = 2t + 18 \frac{1}{t+1} (t+1)' = 2t + \frac{18}{t+1}.$$

και εκφράζει την ταχύτητα  $v(t)$  του σημείου κάθε χρονική στιγμή  $t$  με  $t \geq 0$ .

- ii) Η αρχική ταχύτητα του σημείου είναι  $v(0) = S'(0) = 2 \cdot 0 + \frac{18}{0+1} = 18 \left( \frac{m}{s} \right)$

- iii) Η επιτάχυνση του σημείου κάθε χρονική στιγμή  $t$  είναι

$$\gamma(t) = v'(t) = S''(t) = \left( 2t + \frac{18}{t+1} \right)' = 2 + \frac{(18)'(t+1) - (18)(t+1)'}{(t+1)^2} = 2 - \frac{18}{(t+1)^2}$$

Επομένως τη χρονική στιγμή  $t = 5$  s, η επιτάχυνση είναι

$$\gamma(5) = 2 - \frac{18}{(5+1)^2} = 2 - \frac{18}{36} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \left( \frac{m}{s^2} \right)$$

iv) Η ταχύτητα του σημείου κάθε χρονική στιγμή  $t$  δίνεται από τη συνάρτηση  $v(t) = 2t + \frac{18}{t+1}$  με

$$v'(t) = \left(2t + \frac{18}{t+1}\right)' = 2 - \frac{18}{(t+1)^2} \text{ οπότε:}$$

$$\begin{aligned} v'(t) = 0 &\Leftrightarrow 2 - \frac{18}{(t+1)^2} = 0 &\Leftrightarrow 2 = \frac{18}{(t+1)^2} \\ &\Leftrightarrow 2(t+1)^2 = 18 &\Leftrightarrow (t+1)^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow t+1 = 3 &\Leftrightarrow t = 2 \end{aligned}$$

Κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμων της  $v'(t)$ :

$t$	0	2	$+\infty$
$v'(t)$	-	0	+
$v(t)$			

Ελάχ.

Άρα η ταχύτητα γίνεται ελάχιστη τη χρονική στιγμή  $t = 2$  s.

$$\text{Η ελάχιστη ταχύτητα είναι } v(2) = 2 \cdot 2 + \frac{18}{2+1} = 4 + 6 = 10 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right).$$